



Milan noir	<i>Milvus migrans</i>			
Oiseaux	Accipitriformes	Accipitridés		
Code Natura 2000	A073			
Protection	Nationale			
Directive « Oiseaux »	Annexe I			
			Photo : L. Kee – CC BY-SA	Photo : A. Trepte – CC BY-SA

Echelle biogéographique		France	Picardie						
Etat de conservation		Etat de conservation	Indice de rareté	Degré de menace	Niveau de connaissance	Nature du manque d'information	Répartition régionale / répartition biogéographique	Etat de conservation à l'échelle régionale	Priorité de conservation
Atlantique	Continental	Moyennement défavorable	Très Rare	En Danger critique	Moyennement satisfaisant	-	Espèce relativement bien représentée sur l'ensemble de sa répartition biogéographique.	Défavorable	Très fortement prioritaire
Non connu	Non connu			En Danger Vulnérable					

DESCRIPTION DE L'ESPECE	BIOLOGIE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Taille intermédiaire entre la Buse variable <i>Buteo buteo</i> et le Milan royal <i>Milvus milvus</i>.</li> <li>- Le Milan noir se caractérise par sa queue faiblement échancrée et sa coloration très sombre. Il paraît entièrement noir lorsqu'on l'observe de loin, mais son plumage est, en fait, brun foncé uniforme sur le dessus du corps, avec une zone beige diffuse sur les primaires et brun-roux strié de noir dessous.</li> <li>- La tête est d'un blanc brunâtre strié de noir.</li> <li>- Les jeunes ont le corps plus clair ; ce n'est qu'à deux ans qu'ils acquièrent totalement leur plumage d'adulte.</li> <li>- Longueur totale du corps : 50 à 60 cm. Masse : 650 à 1000 g.</li> <li>- Il n'y a pas de dimorphisme sexuel apparent.</li> </ul>	<p>Comme l'indique son nom latin, le Milan noir est migrateur. Il quitte l'Europe dès fin juillet pour rejoindre ses quartiers d'hiver en Afrique tropicale, du Sénégal au Kenya. Les premiers oiseaux de retour sont notés dès février, mais la plupart regagnent leur territoire de nidification d'avril à mai.</p> <p>Le Milan noir commence à se reproduire à l'âge de deux ou trois ans. Il semble que les couples soient fidèles et qu'ils gardent généralement le même territoire d'une année sur l'autre. La ponte a lieu essentiellement pendant la seconde quinzaine d'avril ou début mai. La taille des oeufs est très variable, ce qui entraîne des différences dans la durée de l'incubation, 32 à 33 jours en moyenne. L'envol des jeunes a lieu à l'âge de 42 à 50 jours.</p> <p>Charognard, le Milan noir ramasse volontiers les poissons morts à la surface des eaux libres et ne dédaigne pas les déchets, mais il peut aussi capturer les vertébrés et les invertébrés d'un poids inférieur à 600 grammes. Dans les prairies exploitées au moment de la fauche, sa proie principale est alors le Campagnol des champs.</p>

## Répartition de l'espèce en Europe

Espèce de l'Ancien Monde, le Milan noir niche dans toute l'Europe à l'exception des îles Britanniques, du Danemark, de la Norvège et des îles de la Méditerranée. Ses quartiers d'hiver se situent

## Répartition de l'espèce en France

En France, il est absent en tant que nicheur dans le Nord-Ouest, dans quelques régions circum-méditerranéennes et alpines et de la Corse. On le rencontre également en période de migration dans la plupart des régions, le couloir rhodanien étant un axe de passage important. Les derniers migrateurs sont observés en octobre. Le transit des migrateurs européens est très important sur notre territoire et concerne les oiseaux originaires de France, mais aussi la plupart de ceux nichant en Suisse et en Allemagne. Les cols pyrénéens voient ainsi passer chaque année plusieurs dizaines de milliers d'individus.

## Présence de l'espèce en Picardie

En Picardie, l'espèce est essentiellement migratrice. Quelques cas de nidification supposés ou d'estivages sporadiques ci-et-là dans l'Aisne (sud du département et Thiérache) et dans l'Oise notamment aux abords ces centres de stockage des déchets : Saint-Maximin, Bailleul-sur-Thérain, Grisolles...

## Présence de l'espèce sur les sites Natura 2000 picards

N° ZPS	Dpt	Nom du site
FR2210026	02	LE MARAIS D'ISLE
FR2210104	02, 60	MOYENNE VALLÉE DE L'OISE
FR2212001	60	FORÊTS PICARDES : COMPIÈGNE, LAIGUE, OURSCAMPS

## Habitats & éléments d'écologie appliqués à la Picardie

En Picardie, il apparaît difficile de définir une écologie particulière en Picardie. Les cas de reproduction constatés ou supposés montrent juste que l'espèce fréquente de grands massifs boisés et/ou les abords de cours d'eau (Vallée de la Marne où la nidification certaine de l'espèce a été constatée).

De manière générale, le Milan noir fréquente les grandes vallées alluviales, près de lacs ou de grands étangs, pour autant qu'il y trouve un gros arbre pour construire son aire. Il montre une attirance pour nicher en périphérie de décharges d'ordures ménagères. Il ne pénètre que peu les grands massifs forestiers, sauf si ceux-ci bordent un vaste plan d'eau (Champagne, Plaine de Saône).



Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l'espèce et/ou de ses habitats seront traitées dans une fiche à part entière.